



Gleiche Fläche von Rechteck und Quadrat

Ein Rechteck hat die Seitenlängen a und b . Der Punkt E liegt genau $1,0\text{ m}$ unter der Strecke \overline{CD} . Dabei sei $\overline{EF} \perp \overline{CD}$ und $\overline{AE} \perp \overline{BE}$.

Welche ganzzahligen Seitenlängen b kann das Rechteck haben, wenn die Seitenlängen eines dem Rechteck flächengleichen Quadrates über den Seiten c auch ganzzahlig sind?



Idee der Aufgabe nach „Der Teppichboden“, Aufgabe No.57 aus der Rätselsammlung „Euklids Wohnzimmer“ von Heinrich Hemme



Lösung

Das Dreieck $\triangle ABE$ ist rechtwinklig. Es gelten die Beziehungen

$$a^2 = x^2 + c^2, \quad \dots(1),$$

$$x^2 = a \cdot x_E, \quad \dots(2).$$

Im Dreieck $\triangle AKE$ ist

$$x^2 = x_E^2 + h^2, \quad \dots(3).$$

(2)=(3)

$$a \cdot x_E = x_E^2 + (b-1)^2, \quad 0 = x_E^2 - a \cdot x_E + (b-1)^2,$$

positive Lösung entfällt

$$x_E = \frac{a}{2} - \sqrt{\frac{a^4}{4} - (b-1)^2} \quad \dots(4).$$

Mit (1), (3) ist

$$a^2 = x_E^2 + (b-1)^2 + c^2,$$

und (4)

$$a^2 = \left(\frac{a}{2} - \sqrt{\frac{a^4}{4} - (b-1)^2} \right)^2 + (b-1)^2 + c^2,$$

$$a^2 - (b-1)^2 - c^2 = \frac{a^2}{4} - a \cdot \sqrt{\frac{a^4}{4} - (b-1)^2} + \frac{a^4}{4} - (b-1)^2,$$

$$\frac{a^2}{2} - c^2 = -a \cdot \sqrt{\frac{a^4}{4} - (b-1)^2},$$

mit $c^2 = a \cdot b$ nach Voraus. $\frac{a^2}{2} - ab = -a \cdot \sqrt{\frac{a^4}{4} - (b-1)^2},$ $\frac{a}{2} - b = -\sqrt{\frac{a^4}{4} - (b-1)^2}$
quadriert $\frac{a^2}{4} - ab + b^2 = \frac{a^4}{4} - (b-1)^2,$ $2 \cdot b^2 - 2 \cdot b \cdot ab + 1 = 0,$
mit $c^2 = a \cdot b$ $b^2 - b - \frac{c^2}{2} + \frac{1}{2} = 0,$ $b_{1,2} = \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{c^2}{2} - \frac{1}{2}},$
negative Lösung entfällt $b = \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{2 \cdot c^2}{4} - \frac{1}{4}},$ $b = \frac{1}{2} \cdot \left(1 + \sqrt{2 \cdot c^2 - 1} \right).$

Die Seite b wird nur dann ganzzahlig, wenn $2 \cdot c^2 - 1$ eine ungerade Quadratzahl ist.
Dann ist mit $n \in \mathbb{N}, n > 0$ $2 \cdot c^2 - 1 = (2 \cdot n - 1)^2,$ $c^2 = 2 \cdot n \cdot (n - 1) + 1.$
Das kleine Python-Programm liefert für die ersten 50000 ungeraden Zahlen sieben ganzzahlige Wertepaare der Seiten b und c . Das Durchlaufen der Schleifen dauert ungefähr eine Viertelstunde.
 $z = 50000$

```
for i in range(1,z):
    liste1 = round(2*i*(i-1)+1)
    for j in range(1,z):
        liste2 = j**2
        if liste1==liste2:
            b = round(((1 + (2 * j * *2 - 1) * *0.5))/2)
            a = j * *2/b
            print("Seite c =" ,j,"m, Seite b =" ,b,"m, Seite a =" ,a,"m")
```

Ingmar Rubin, Berlin, hat das Programm wunderbar vereinfacht, das für die ersten 900000 ungeraden Zahlen schon nach 1,5 Sekunden zwei weitere Lösungen findet.
 $z = 900000$

```
for i in range(1,z):
    j = 2*i*(i-1) + 1
    if math.sqrt(j) % 1 == 0:
        b = round((1 + math.sqrt(2 * j - 1))/2)
        a = j/b
        print("Seite c =" ,j,"m, Seite b =" ,b,"m, Seite a =" ,a,"m")
```

Nr.	c in m	$b = n$ in m	a in m
1	1	1	1
2	5	4	6,25
3	29	21	40,04762
4	169	120	238,00833
5	985	697	1392,00143
6	5741	4060	8118,00025
7	33461	23661	47320,00004
8	195025	137904	275806,00001
9	1136689	803761	1607520,000001